

การห่อผลชมพู่พันธุ์เพชรบุรี เพื่อป้องกันการทำลายจากแมลงวันผลไม้

อรพิน เกิดชูชื่น¹

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ว่าที่ ร.อ. ณรงค์ชัย ค่ายใส²

สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

บทคัดย่อ

ในการศึกษาการห่อผลชมพู่พันธุ์เพชรบุรีเพื่อป้องกันการทำลายจากแมลงวันผลไม้ โดยใช้วัสดุห่อผลชมพู่ 4 ชนิด คือ ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงผ้า (รีเมย์[®]) นอกจากจะเป็นการป้องกันการทำลายจากแมลงวันผลไม้ แล้วยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของชมพู่พันธุ์เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบการระบาดของแมลงวันผลไม้ในชมพู่ที่ได้รับการห่อผลด้วยวัสดุทุกชนิด ส่วนการห่อผลด้วยถุงพลาสติกจะทำให้เกิดการร่วงของผลมาก ปริมาณ soluble solids มีมากที่สุดในผลที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และถุงผ้ารีเมย์ นอกจากนี้ยังพบว่าชมพู่ที่ห่อด้วยถุงผ้ารีเมย์มีความเหมะสมที่สุดเนื่องจากให้สีและมีรสชาดเป็นที่นิยมของผู้ซื้อ

¹ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรีวิวภาพ คณะทรัพยากรีวิวภาพและเทคโนโลยี

² นักวิชาการเกษตร ๖

**8 VLQJ & RYHUIQJ 0 DMUDOVHQ5 RVH\$ SSQI
IRU3 URWFMVQJ ' DP DJHIURP VH) UXIMQ**

2 UDIQ HGFKRHKXHQ¹

. LQJ 0 RQJ NXWV8 QLYHULW RI 7 HFQRORJ \ 7 KRQEXL Bangmod, 7 RRQJNU % DQJ NRN

1 DUQFKDL DV VDL²

: HMLQ5 H IRQDS J UEXOKUDO WQMRQ2 IIIFHADQS RQJ ' DWFWDMMUL

\$ EWWDFW

%DJLQ RI URVHSSQI XI HQDMMQIFDFY3 HWKEXUXVIQI QHZ VSDSHEURZ QSDSHU
SOWIE DQGZ KIMFORW (Remay®)EJ VZ DWFQGXFWG7 KHSXLSRVHRI WLYWNG Z HHHUHGXFH
WHGD P DJHURP VHUXIMQ DQGWLQFUHDHMHUXIMDOW 7 KHHXOWKRZ HGMDQRCIP DJH
IURP IUXIMQ Z DREHVHGIQDODJLQJ P DMUDOVHZ HYHEDJLQJ Z IXWHSOWIE EDJ JDYHMH
KJ KHMXXMRS 6 ROEOMRQENZ HJKL KIQUERWEDJLQJ Z IXQHZ VSDSHDQGZ KIMFORWEDJ V
7 DWDQGFROUZ HHDMGKL KHMURVHSSQEDJ HGZ IXZ KIMFORWEDJ

¹ FUMHQ&KLUQP QKQKQKQWCA CPCACOPBE QQQKQKQKQWALCPF 6CEPQQ/

² WQCH CWC5RGECHW

บทนำ

ชมพู่พันธุ์เพชรบุรี (*Eugenia javanica* cv Petchburi) หรือ “ชมพู่เพชร” เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ปลูกรวม 1,261 ไร่ ปัจจุบันในการผลิตชมพู่เพชรที่สำคัญคือการทำลายของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงวันผลไม้ [1,2] นอกจากจะทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วยังทำให้คุณภาพของชมพู่ลดลงไปด้วย ในการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้นั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพและไม่ทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งไม่มีสารพิษตกค้างถึงผู้บริโภค คือการใช้วัสดุห่อผลชมพู่ เช่น ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล ถุงพลาสติก และวัสดุอื่นๆ เช่น ถุงผ้ารีเมค ซึ่งเป็นถุงผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ โปร่งใส [4,5]

แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง จัดอยู่ใน Order Diptera การเข้าทำลายของแมลงชนิดนี้ จะทำลายส่วนของผลมากที่สุดทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ซึ่งบางครั้งจะพบว่าทำลายผลผลิตเสียหายร้อยละ 100 [3,4] กรมส่งเสริมการเกษตร [5] รายงานว่าพบแมลงวันผลไม้ในประเทศไทยมากกว่า 50 ชนิด การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้สามารถทำได้หลายวิธี โดยอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การห่อผล การใช้เหยื่อพิษ (Bait Spray) การตัดแต่งกิ่งและเก็บผลที่ถูกทำลายทิ้ง การใช้สารอ่อน การทำหมันแมลง (Sterile insect release method) ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ และการใช้สารเคมี

การห่อผลนอกจากจะช่วยในการป้องกันผลไม้จากโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้แล้ว ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลไม้ เช่น ขนาดของผล ลักษณะเนื้อและสีผิวของเปลือกให้สูงขึ้นอีกด้วย [6] การห่อผลทำให้การหลุดร่วงของผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวลดลง [7] นอกจากนี้ การห่อผลยังสามารถปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เช่น สี [8] น้ำหนักผลผลิต [9] ปริมาณ Soluble Solids (SS) [10] สูงขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในถุงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในการพัฒนาของผลไม้ ปริมาณ Lenticle ที่ผิวของผลไม้ที่มีการห่อผลจะมีมากกว่าผลที่ไม่ได้ห่อ และการห่อผลยังสามารถเก็บเกี่ยผลผลิตได้เร็วขึ้น [9]

การศึกษาที่เป็นการศึกษาวัสดุที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ห่อชมพู่พันธุ์เพชรบุรี เพื่อป้องกันการทำลายจากแมลงวันผลไม้ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตชมพู่ ซึ่งจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ

- ทำการห่อผลชมพู่พันธุ์เพชรบุรีหลังจากดอกบาน 1 อาทิตย์ซึ่งเป็นระยะหลังจากที่มีการผสมเกสรและกลีบเลี้ยงเริ่มร่วง โดยห่อทั้งช่อผลหลังจากที่ตัดแต่งเหลือ 10 ผลต่อ 1 ช่อและห่อผลทุกช่อ ผลในแต่ละต้นชมพู่ทดลอง ใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ทรีตเมนต์ คือ ไม่ห่อผล (control) ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ห่อด้วยถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล

(ถุงปูนซิเมนต์) ห่อด้วยถุงพลาสติกหุ้ว และห่อด้วยถุงผ้า (รีเมีย^๑) แต่ละทรีเมนต์มีจำนวน 3 ช้ำ ในแต่ละช้ำใช้ชัมพู่ 1 ตันที่มีอายุ 5 ปีและมีขนาดสม่ำเสมอเท่ากัน ใช้ดันชัมพู่พันธุ์เพชรบุรี ทั้งสิ้น 15 ตัน จากสวนเกษตรกรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทดลองระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2540

2. การบันทึกข้อมูล โดยบันทึกน้ำหนักผลสด (กรัม) ต่อ 1 ผล คะແນนการทำลายผลซึ่งโดย
แมลงวันผลไม้ และคะແນนผลร่วง คะແນนเต็ม=10 คะແນน (10 คะແນน=ชมพู่ที่ถูกทำลายหรือร่วง
ทุกผล และ 5 คะແນน=ชมพู่ที่ถูกทำลายหรือร่วงร้อยละ 50) ปริมาณ Soluble Solids (^oBrix) ของน้ำคั้น
จากผลสดและวัดโดย hand refractometer สำหรับคะແນนคุณภาพ โดยผู้ชี้มิ (เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย
40 ปี) ที่มีประสบการณ์จำนวน 9 คน ให้คะແນนสีและรสชาติ คะແນนเต็ม=5 (ขอบมาก=5 ปานกลาง
=4 พอดี=3 ขอบน้อย=2 ไม่ขอบ=1)

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี t / t' / HSDQFDQWIIHDFQFH ใช้ XQFDQW1HZ 0 XQFDQW15DQJH 7HVW0 5 7

ผลการศึกษา

จากการทดลองพบว่า ในชุมชนที่ไม่ได้ห่อผลจะพบการทำลายของแมลงวันผลไม้ ร้อยละ 40 ในขณะที่ห่อด้วยวัสดุทุกชนิดจะไม่พบการทำลายของแมลงวันผลไม้ (ตารางที่ 1) สำหรับการร่วงของผลชุมชน พบร่วงว่าการห่อด้วยถุงพลาสติกหุ้วมีการร่วงมากที่สุด รองลงมาคือการไม่ห่อผล สำหรับถุงกระดาษหนังสือพิมพ์พบว่ามีคะแนนการร่วงเฉลี่ยต่ำที่สุด (ตารางที่ 1)

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของน้ำหนักผล (ตารางที่ 2) พบว่า การห่อผลด้วยวัสดุทุกชนิดให้น้ำหนักสูงกว่าไม่ห่อผลอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะไม่พบความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ห่อทั้ง 4 ชนิดแต่ผลชมพู่เพชรที่ห่อด้วยถุงผ้ารีเมย์ให้น้ำหนักสูงสุด คือ 80 กรัมต่อ 1 ผล รองลงมาได้แก่ ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล และถุงพลาสติก ตามลำดับ สำหรับปริมาณ Soluble Solids ในชมพู่ที่ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงผ้ารีเมย์ และถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล พบว่ามีปริมาณ Soluble Solids สูงกว่าผลชมพู่ที่ไม่ได้ห่อ สำหรับการห่อด้วยถุงพลาสติก พบว่า ทำให้ผลชมพู่มีปริมาณ Soluble Solids ต่ำที่สุด (ตารางที่ 2) ในทำนองเดียวกับปริมาณ Soluble Solids ชมพู่ที่ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงผ้ารีเมย์ และถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล มีค่าแหนรสชาติจากผู้ชุมชนสูงกว่าการไม่ห่อผล ส่วนชมพู่ที่ห่อด้วยถุงพลาสติกมีค่าแหนรสชาติต่ำที่สุด (ตารางที่ 2)

สีของผลชมพู่ พบร่วมกับสีของผลที่ห่อด้วยวัสดุต่างชนิดกันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (ตารางที่ 2) สีของผลที่ขาวและนวลกว่าเป็นที่ต้องการและมีคะแนนมากที่สุด คือ 4.45 ได้จากการห่อผลด้วยถุงกระดาษเหนียวสีนำตาล คะแนนรองลงมาได้แก่ ผลชมพู่ที่ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ผลชมพู่ที่ห่อด้วยถุงผ้าริเมร์ ไม่ห่อผล และผลชมพู่ที่ห่อด้วยถุงพลาสติก ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยการเข้าทำลายผลชมพูโดยแมลงวันผลไม้และคะแนนการร่วงของผลชมพู

ทรีตเมนต์	คะแนนการเข้าทำลายผลชมพูโดยแมลงวันผลไม้	คะแนนการร่วงของผลชมพู
ไม่ห่อผล	4.00a	6.32a
ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์	0.00b	0.10b
ถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล	0.00b	0.67b
ถุงพลาสติกหุ้วหิ้ว	0.00b	7.83a
ถุงผ้า (รีเมย์®)	0.00b	1.17b

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันใน column เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดย Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ตารางที่ 2 น้ำหนักผลสด ปริมาณ Soluble Solids และคะแนนการซึม ของชมพูพันธุ์เพชรบูรีที่ห่อด้วยวัสดุชนิดต่างๆ

ทรีตเมนต์	น้ำหนักผลสด (กรัม/ผล)	ปริมาณ Soluble Solids ([°] Brix)	คะแนนการซึม	
			รสชาติ	สี
ไม่ห่อผล	65.00b	12.85b	2.68b	1.98d
ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์	76.67a	13.74a	4.18a	4.05b
ถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล	75.00a	13.54a	4.37a	4.45a
ถุงพลาสติกหุ้วหิ้ว	73.33a	9.75c	1.08c	1.13e
ถุงผ้า (รีเมย์®)	80.00a	13.58a	4.28a	2.40c

หมายเหตุ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันใน column เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดย Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

วิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาพบว่า ในชมพูที่ไม่ได้ห่อผลพบการทำลายของแมลงวันผลไม้ ในขณะที่ห่อด้วยวัสดุทุกชนิดไม่พบการทำลายของแมลงวันผลไม้ การทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในลินจี โดยวีระชัย [6] และในมะม่วงโดยยืนยง [7] แสดงว่าการทำลายของผลชมพูด้วยวัสดุชนิดต่างๆ สามารถป้องกันการทำลายของแมลงได้ สำหรับการร่วงของผลชมพู พบว่า การห่อด้วยถุงพลาสติกหุ้วหิ้วมีการร่วงมากที่สุด อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในถุงพลาสติกไม่เหมาะสม การระบายอากาศไม่ดี อุณหภูมิและความชื้นในถุงพลาสติกสูงกว่าภายนอก ทำให้มีการทำลายของโรคสูงทำให้ผลหลุดร่วงได้มากขึ้น [8,10]

การทำลายของผลชมพูด้วยวัสดุทุกชนิดให้น้ำหนักเฉลี่ยต่อผลสูงกว่าไม่ห่อผล ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของวีระชัย [6] ยืนยง [7] Proctor และ Lougheed [8] ทวีศักดิ์ [10] ที่ศึกษาในลินจี มะม่วง

แอบเปิล และอุ่น ตามลำดับ ทั้งนี้การห่อผลชมพูช่วยทำให้ผลมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้นและผลมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจเนื่องมาจากผลชมพูที่ถูกห่อ มีการสูญเสียน้ำจากการคายน้ำได้น้อยกว่า การขยายขนาดของเซลล์และผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้มากกว่า [8]

ปริมาณ Soluble Solids ในชมพูที่ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงผ้ารีเมร์ และถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล พบร่วมกับปริมาณสูงกว่าผลชมพูที่ไม่ได้ห่อ ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับงานทดลองของทวีศักดิ์ [10] ที่ได้ทดลองในอุ่น ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การใช้วัสดุห่อผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในผล ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและความชื้นมากขึ้น และสภาพแวดล้อมดังกล่าวก็เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายของอาหารสะสม ทำให้พบว่ามีจำนวน Soluble Solids สะสมในผลชมพูที่ห่อด้วยวัสดุต่างๆ มากกว่าที่ไม่ได้ห่อผล [8,9] ซึ่งปริมาณ Soluble Solids สอดคล้องกับคะแนนรสชาติจากผู้ชิม

สีของผลชมพู พบร่วมกับสีของผลที่ห่อด้วยวัสดุต่างชนิดกัน มีความแตกต่างทางสีติดอยู่กับมันย้ำสำคัญยิ่ง สีของผลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้จากการห่อผลด้วยถุงกระดาษเหนียวสีน้ำตาล คะแนนรองลงมาได้แก่ ผลชมพูที่ห่อด้วยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ผลชมพูที่ห่อด้วยถุงผ้ารีเมร์ ซึ่ง Proctor และ Loughheed [8] รายงานว่าการห่อผลทำให้สีของผลดีขึ้นและสม่ำเสมอ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการสูญเสียที่ใช้ห่อผลนั้นอาจลดช่วงแสงบางช่วงคลื่น ซึ่งช่วงแสงส่วนที่ถูกวัสดุห่อผลดูดไว้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสีของชมพูพันธุ์เพชรบุรี ทำให้ชมพูที่ห่อด้วยวัสดุต่างๆ กันมีสีขาวที่ผู้บริโภคชอบมากกว่าที่ไม่ได้ห่อผล

ในการทดลองครั้งนี้ พบร่วมกับ ถุงผ้ารีเมร์ เป็นวัสดุห่อผลชมพูที่มีคุณภาพดีกว่าวัสดุห่อผลชนิดอื่นๆ แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่นของถุงผ้ารีเมร์ด้วย ถึงแม้ว่าถุงผ้ารีเมร์มีอายุการใช้งานมากกว่าวัสดุห่อผลชนิดอื่น แต่ถุงผ้ารีเมร์มีดันทุนสูงกว่าถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ 40 เท่า และมีปริมาณการผลิตและแหล่งผลิตภายในประเทศน้อย เนื่องจากวัสดุห่อผลทุกชนิดสามารถลดการทำลายของแมลงวันผลไม่ได้ดีเท่ากัน ดังนั้นในการใช้วัสดุห่อผลชมพูควรพิจารณาใช้วัสดุที่หาง่ายและราคาถูก โดยเฉพาะการใช้ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผลชมพู เนื่องจากถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ มีดันทุนต่ำมาก หาง่ายที่สุด และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ

เอกสารอ้างอิง

- สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2538, ชุมพรเพชรบุรี, แผ่นปลิวสำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, 2 หน้า.
- จรุศักดิ์ ธรรมรักษ์, 2528, ชุมพรเพชร, สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 45 หน้า.
- กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536ก, เอกสารวิชาการที่ 63 เรื่องแมลงวันผลไม้, โรงพยาบาลชุมนุม สำนักงานเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพ, 26 หน้า.

4. กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536ข, การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้, โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพ, 35 หน้า.
5. กรมส่งเสริมการเกษตร, 2540, คู่มือโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ ปี 2540, กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช, กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, กรมส่งเสริมการเกษตร, 22 หน้า.
6. วีระชัย จงสุวรรณวัฒนา, 2523, การศึกษาการห่อผลลินจี, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ, 12 หน้า.
7. ยืนยง พันธ์ประเสริฐ, 2529, ผลของวัสดุห่อผลที่มีผลต่อคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ หวานเบอร์ 4, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ, 10 หน้า.

URFWU 7 \$ DQG & RXIKHG7 KHIHFW FRYHQJ ISSOMGXUQJ

CHMHRSP HQW HortScience, 11(2):

UXHU : DQG (5ISSRQ IIHFHW
P DMUW IQEDQQDW URS \$ JU

EXQFKFRYHRQ fruit URZ WK DQG

ทวีศักดิ์ แสงอุดม, ผลของวัสดุห่อชนิดต่าง ที่มีต่อคุณภาพผลองุ่นพันธุ์ /RRV Perlette และพันธุ์ %HDXW 6HHGHW ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ, หน้า.